

Baytril®



0,5%

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Αντιμικροβιακό



Πόσιμο διάλυμα ενροφλοξακίνης
για ορνίθια και γαλοπούλες

86562871

**ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ
ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ
ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥ-
ΣΗ ΠΑΡΙΤΔΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΧ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ**

Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας:

Bayer Animal Health GmbH
51368 Leverkusen, Germany

Παραγωγός υπεύθυνος για την απευθεύρωση
των παρτίδων:

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH
Projensdorfer Str. 324, 24106 Kiel, Germany

Τοπικός Αντιπρόσωπος στην Ελλάδα:

ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ ΑΕ

Φλεμινγκ 15
15123 Μαρούσι - Αθήνα
Τηλ.: +30 2106800900
Fax: +30 2106833488
E-mail: info@hellafarm.gr

Τοπικός Αντιπρόσωπος στην Κύπρο:

ACTIVET LTD

Αντρέα Μασούλη 50
2415 Έγκωμη - Λευκωσία
Τηλ.: +357 22591918
Fax: +357 22591917
E-mail: info.activet@cytanet.com.cy

**ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α)
ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ**

Το 1 ml διαλύματος περιέχει:

Δραστικό συστατικό:

Enrofloxacin 5 mg

Έκδοχα:

Potassium hydroxide
Benzyl alcohol
Hypromellose
Water purified

ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)

Θεραπεία των λοιμώξεων που προκαλούνται
από τα ακόλουθα ευαισθητά στην ενροφλο-
ξακίνη βακτήρια:

Ορνίθια

Mycoplasma gallisepticum,
Mycoplasma synoviae,
Avibacterium paragallinarum,
Pasteurella multocida
Γαλοπούλες
Mycoplasma gallisepticum,
Mycoplasma synoviae,
Pasteurella multocida

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Να μη χρησιμοποιείται για πρόληψη.

Να μη χρησιμοποιείται όταν είναι γνωστό ότι
στην εκτροφή που πρόκειται να υποβληθεί σε
θεραπεία υπάρχει ανθεκτικότητα / διασταυ-
ρούμενη ανθεκτικότητα σε (φθοριο)κινολόνες.
Να μη χορηγείται σε ωοπαράγωγες όρνιθες,
τα αυγά των οποίων προορίζονται για ανθρώ-
πινη κατανάλωση.

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Δεν είναι γνωστή καμία.

Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή
άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέ-
ρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης,
παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικώς τον
κτηνίατρό σας.

ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ

Ορνίθια και γαλοπούλες

**ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ
ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ**

Χορηγείται από το στόμα με το πόσιμο νερό.

Ορνίθια και γαλοπούλες

10 mg ενροφλοξακίνη/kg σωματικού βάρους
την ημέρα επί 3-5 διαδοχικές ημέρες.
Θεραπεία επί 3-5 διαδοχικές ημέρες. Επί 5
διαδοχικές ημέρες για μικτές λοιμώξεις και
χρόνιες εξελισσόμενες μορφές. Εάν εντός 2-3
ημερών δεν επιτευχθεί κλινική βελτίωση, πρέ-
πει να εξετασθεί το ενδεχόμενο εναλλακτικής
αντιμικροβιακής θεραπείας με βάση δοκιμή
ευαισθησίας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

Καμία

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Ορνίθια: Κρέας και εδώδιμο ιστοί: 7 ημέρες
Γαλοπούλες: Κρέας και εδώδιμο ιστοί:
13 ημέρες
Δεν επιτρέπεται η χρήση σε πτηνά τα οποία
παράγουν αυγά για κατανάλωση από τον
άνθρωπο.

Να μη χορηγείται σε ωοπαράγωγα πτηνά
αντικατάστασης για 14 ημέρες πριν από την
έναρξη της ωοτοκίας.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Φυλάσσεται σε ξηρό μέρος, σε θερμοκρασία
έως 25°C.

Διάρκεια ζωής μετά το πρώτο άνοιγμα της
στοιχειώδους συσκευασίας: 28 ημέρες
Διάρκεια ζωής του προϊόντος αναμειγμένο με
το πόσιμο νερό: 2 ημέρες

Να μη χρησιμοποιείται μετά την ημερομηνία
λήξης που αναγράφεται στο κουτί.

ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ)

Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η επίσημη αντι-
μικροβιακή πολιτική, όταν χρησιμοποιείται το
προϊόν.

Δεδομένου ότι η ενροφλοξακίνη εγκρίθηκε
αρχικά για χρήση σε πουλερικά, υπήρξε γενι-
κευμένη μείωση της ευαισθησίας του *E. coli*
στις φθοροκινολόνες, καθώς και εμφάνιση
ανθεκτικών οργανισμών. Στην ΕΕ, έχει επίσης
αναφερθεί ανθεκτικότητα στο *Mycoplasma*
synoviae.

Το προϊόν, όπως και όλες οι κινολόνες, θα
πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο κατόπιν
δοκιμής ευαισθησίας. Θα πρέπει να χρησιμο-
ποιείται ως φάρμακο τελευταίας επιλογής.
Η χρήση του προϊόντος, εκτός των οδηγιών
που περιλαμβάνονται στην περιλήψη των
χαρακτηριστικών του προϊόντος, πιθανό να
αυξήσει την αντίσταση των βακτηρίων στις
κινολόνες και μπορεί να μειώσει την αποτελε-
σματικότητα της θεραπείας με άλλες (φθορο)
κινολόνες λόγω διασταυρούμενης ανθεκτι-
κότητας.

**ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ**

Συμβουλευθείτε τον κτηνίατρό σας για τον
τρόπο απόρριψης των χρησιμοποιηθέντων
φαρμάκων. Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στην
προστασία του περιβάλλοντος.

**ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ
ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ**

Ελλάδα: 26-02-2016

Κύπρος: 21-09-2015

**ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ**

Κουτί με πλαστική φιάλη των 50 ml
Κουτί με πλαστική φιάλη των 100 ml με δοσο-
μετρική αντλία του 1 ml με μακρύ σωλήνα
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευα-
σίες.

Αριθμός Άδειας Κυκλοφορίας στην Ελλάδα:

30087/24-04-2009/K-0051708

Αριθμός Άδειας Κυκλοφορίας στην Κύπρο:
17914

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το
παρόν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν,
παρακαλείσθε να απευθυνθείτε στον τοπικό
αντιπρόσωπο του κατόχου της άδειας κυκλο-
φορίας.

***Να διατίθεται μόνον με κτηνιατρική
συνταγή***

**ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ
ΔΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ**

**ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ:
+30 210 7793777**

Bayer