

Eprizero 5mg/ml διάλυμα επίχυσης για μόσχους και αγελάδες γαλακτοπαραγωγής

ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΧ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ
Norbrook Laboratories Limited
Station Works
Newry
Co. Down, BT35 6JP
Northern Ireland

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ (ΕΣ) ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

1 ml του διαλύματος περιέχει:

Επρινομεκτίνη:	5 mg
Βουτυλιωμένο υδροξυτολουόλιο (E321)	0.1mg

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Ενδείκνυται για τη θεραπεία και πρόληψη των ακόλουθων παρασίτων:

Γαστρεντερικά νηματώδη (ενήλικες μορφές και προνύμφες 4ου σταδίου): *Ostertagia* spp., *Ostertagia lyrata* (ενήλικα), *Ostertagia ostertagi* (συμπεριλαμβανομένου του *O. ostertagi*), *Cooperia* spp. (συμπεριλαμβανομένου του *Cooperia* spp.), *Cooperia oncophora*, *Cooperia pectinata*, *Cooperia punctata*, *Cooperia sumabada*, *Haemonchus placei*, *Trichostrongylus* spp., *Trichostrongylus axei*, *Trichostrongylus colubriformis*, *Bunostomum phlebotomum*, *Nematodirus helvetianus*, *Oesophagostomum* spp. (ενήλικα), *Oesophagostomum radiatum*, *Trichuris* spp (ενήλικα).

Πνευμονικοί στρόγγυλοι (ενήλικα παράσιτα και προνύμφες 4ου σταδίου): *Dictyocaulus viviparus*

Υπόδημα (παρασιτικό στάδιο): *Hypoderma bovis*, *H. lineatum*
Ψώρες: *Chorioptes bovis*, *Sarcoptes scabiei* var *bovis*
Φθείρες: *Damalnia bovis* (biting lice), *Linognathus vituli* (sucking lice), *Haematopinus eurysternus* (sucking lice), *Solenopotes capillatus* (sucking lice).

Μύγες: *Haematobia irritans*.

Διάρκεια δράσης

Όταν το προϊόν εφαρμόζεται στην συνιστώμενη δόση, αποτρέπει την επαναμόλυνση από τα παρακάτω παράσιτα:

Παράσιτα *	Διάρκεια δράσης
<i>Dictyocaulus viviparus</i>	έως 28 ημέρες
<i>Ostertagia</i> spp	έως 28 ημέρες
<i>Oesophagostomum radiatum</i>	έως 28 ημέρες
<i>Cooperia</i> spp	έως 21 ημέρες
<i>Trichostrongylus</i> spp	έως 21 ημέρες
<i>Haemonchus placei</i>	έως 14 ημέρες
<i>Nematodirus helvetianus</i>	έως 14 ημέρες

Τά παρακάτω παράσιτα συμπεριλαμβάνονται σε κάθε ξεχωριστό γένος: *Ostertagia ostertagi*, *O. lyrata*, *Cooperia oncophora*, *C. punctata*, *C. sumabada*, *Trichostrongylus axei*, *T. colubriformis*.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Το προϊόν προορίζεται μόνο για τοπική εφαρμογή σε μόσχους και αγελάδες γαλακτοπαραγωγής, συμπεριλαμβανομένου και τις θηλάζουσες αγελάδες γαλακτοπαραγωγής. Μην το χρησιμοποιείτε σε άλλα είδη ζώων. Μην το χορηγείτε από στόματος ή με ένεση.

Μην το χρησιμοποιείτε σε ζώα με γνωστή υπερευαισθησία στο δραστικό συστατικό ή τα έκδοχα.

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Δεν έχουν παρατηρηθεί ανεπιθύμητες ενέργειες όταν το προϊόν χρησιμοποιείται στη συνιστώμενη δόση. Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικούς τον κτηνίατρό σας.

ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ

Μόσχοι και αγελάδες γαλακτοπαραγωγής.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ ΖΩΟΥ, ΟΔΟΣ (ΟΙ) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Χορηγήστε μόνο με τοπική εφαρμογή στη δόση του 1 ml ανά 10 kg σωματικού βάρους, που αντιστοιχεί στο ποσοστό συνιστώμενης δόσης των 0,5 mg επρινομεκτίνης ανά kg σωματικού βάρους. Το προϊόν πρέπει να εφαρμόζεται τοπικά με την έγχυση κατά μήκος της ράχης σε μια στενή λωρίδα που εκτείνεται από το ακρώμιο ως την βάση της ουράς.

Εάν υπάρχει κίνδυνος επαναμόλυνσης ή συμβουλή κτηνίατρου θα πρέπει να ζητείται όσον αφορά την ανάγκη και τη συχνότητα της επαναλαμβανόμενης χορήγησης.

Για καλύτερα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε το προϊόν ως μέρος ενός προγράμματος για τον έλεγχο τόσο των εσωτερικών όσο και των εξωτερικών παρασίτων των βοοειδών με βάση την επιδημιολογία αυτών των παρασίτων.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

Για να εξασφαλιστεί η χορήγηση της σωστής δόσης, το σωματικό βάρος θα πρέπει να καθορίζεται όσο το δυνατόν ακριβέστερα. Η ακρίβεια της συσκευής χορήγησης πρέπει να ελέγχεται. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή της δοσομετρικής συσκευής, την προσαρμογή της δόσης, και φροντίδα του πιστολιού χορήγησης μετά τη χρήση.

Η βροχή σε οποιαδήποτε στιγμή πριν ή μετά τη θεραπεία δεν θα επηρεάσει την αποτελεσματικότητα του προϊόντος.

ΧΡΟΝΟΙ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Κρέας & εντόσθια: 10 ημέρες

Γάλα: 0 ώρες

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ

Μη φυλάσσετε πάνω από 30 ° C. Διατηρείτε τον περιέκτη στο εξωτερικό κουτί. Προστατέψτε τον από το φως

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η επρινομεκτίνη είναι πολύ τοξική για τους υδρόβιους οργανισμούς και μπορεί να συσσωρευτεί σε ιζήματα. Όπως και άλλες μακροκυκλικές λακτόνες, η επρινομεκτίνη έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει δυσμενώς οργανισμούς μη-στόχους. Μετά την χορήγηση, η απέκκριση των δυναμικά τοξικών επίπεδων επρινομεκτίνης μπορεί να διαρκέσει για αρκετές εβδομάδες. Τα κόπρανα που περιέχουν επρινομεκτίνη αποβάλλονται σε βοσκότοπος από τα υπό θεραπεία ζώα και μπορεί να μειώσει και να υποβαθμίσει τον πληθυσμό των οργανισμών που διατρέφονται με κόπρανα.

Ο κίνδυνος για τα υδάτινα οικοσυστήματα και τη πανίδα μπορεί να μειωθεί με την αποφυγή της συχνής και επαναλαμβανόμενης χρήσης της επρινομεκτίνης (και τα προϊόντα της ίδιας ανθελμινθικής κατηγορίας) στα βοοειδή.

Ο κίνδυνος για τα υδάτινα οικοσυστήματα μπορεί να μειωθεί περαιτέρω με τη διατήρηση των υπό θεραπεία βοοειδών μακριά από υδάτινες μάζες για δύο έως τέσσερις εβδομάδες μετά τη θεραπεία.

Ειδικές προφυλάξεις κατά τη χρήση σε ζώα:

Ενώ οι αριθμοί των ακάρεων και των ψειρών ελαττώνονται ταχέως μετά την αγωγή, λόγω των διατροφικών συνθηκών των παρασίτων, σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να απαιτούνται αρκετές εβδομάδες για την πλήρη εξάλειψη τους.

Δεν πρέπει να χορηγείται από το στόμα ή με ένεση.

Για αποτελεσματική χρήση, το προϊόν δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται σε περιοχές της ράχης που καλύπτεται με λάσπη ή κοπριά.

Το προϊόν πρέπει να εφαρμόζεται μόνο σε υγιές δέρμα. Πρέπει να ληφθεί μέριμνα για να αποφευχθούν οι ακόλουθες πρακτικές επειδή αυξάνουν τον κίνδυνο ανάπτυξης αντοχής που θα μπορούσε τελικά να οδηγήσει σε αναποτελεσματική θεραπεία:

– Η πολύ συχνή και επαναλαμβανόμενη χρήση των ανθελμινθικών από την ίδια κατηγορία, επί μιας εκτεταμένης χρονικής περιόδου.

– Η υποδοσολογία, η οποία μπορεί να οφείλεται σε υποεκτίμηση του σωματικού βάρους, τον τρόπο χορήγησης του προϊόντος, ή η έλλειψη της βαθμονόμησης της συσκευής χορήγησης (εάν υπάρχει).

Υποψία κλινικών περιπτώσεων ανθεκτικότητας σε ανθελμινθικά πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω με τη χρήση κατάλληλων δοκιμών (π.χ. Egg Count Reduction Test κοπράνων).

Όταν, τα αποτελέσματα της δοκιμής (ων) δείχνουν σοβαρή αντίσταση σε ένα συγκεκριμένο ανθελμινθικό, θα πρέπει να χρησιμοποιείται ένα ανθελμινθικό που ανήκει σε άλλη φαρμακολογική κατηγορία και έχει ένα διαφορετικό τρόπο δράσης.

Μέχρι σήμερα καμία ανθεκτικότητα στην επρινομεκτίνη (μακροκυκλική λακτόνη) έχει αναφερθεί στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο ανθεκτικότητα σε άλλες μακροκυκλικές λακτόνες έχει αναφερθεί σε είδη παρασίτων στα βοοειδή εντός της ΕΕ. Ως εκ τούτου, η χρήση αυτού του προϊόντος θα πρέπει να βασίζεται σε τοπικές (περιφερειακές, αγρόκτημα) επιδημιολογικές πληροφορίες σχετικά με την ευαισθησία των νημάτων και σε προτάσεις σχετικές με το πώς να περιοριστεί περαιτέρω η ανθεκτικότητα σε ανθελμινθικά.

Ειδικές προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το φαρμακευτικό προϊόν σε ζώα:

Αυτό το προϊόν μπορεί να είναι ερεθιστικό για το ανθρώπινο δέρμα και τα μάτια και μπορεί να προκαλέσει υπερευαισθησία. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια με το προϊόν κατά τη διάρκεια της θεραπείας και κατά το χειρισμό των ζώων που έχουν υποβληθεί πρόσφατα σε θεραπεία.

Οι χρήστες θα πρέπει να φορούν λαστιχένια γάντια, μπότες και ένα αδιάβροχο παλτό κατά την εφαρμογή του προϊόντος. Εάν τα ρούχα μολυνθούν, αφαιρέστε τα όσο το δυνατόν συντομότερα και πλύντε τα πριν τα ξαναφορέσετε.

Σε περίπτωση τυχαίας επαφής με το δέρμα, ξεπλύνετε την προσβεβλημένη περιοχή αμέσως με σαπούνι και νερό.

Σε περίπτωση τυχαίας έκθεσης στα μάτια, ξεπλύνετε τα μάτια αμέσως με νερό.

Αυτό το προϊόν μπορεί να είναι τοξικό μετά από τυχαία κατάποση. Αποφύγετε την τυχαία κατάποση του προϊόντος με το χέρι στο στόμα.

Μην καπνίζετε, τρώτε ή πίνετε κατά το χειρισμό του προϊόντος. Σε περίπτωση κατάποσης, ξεπλύνετε το στόμα με νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. Πλύνετε τα χέρια σας μετά τη χρήση. Αυτό το προϊόν είναι εύφλεκτο. Να φυλάσσεται μακριά από πηγές ανάφλεξης. Εισποή του προϊόντος μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό. Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο ή σε εξωτερικούς χώρους.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΟΥ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Ή ΆΛΛΩΝ, ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ

Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ή άχρηστα υλικά που προέρχονται από τέτοια κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις.

Εξαιρετικά επικίνδυνο για τα ψάρια και τους υδρόβιους οργανισμούς. Μην μολύνετε λίμνες, ρείθρα ή λάκκους με το προϊόν ή άδειο δοχείο.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ που εγκρίθηκε για τελευταία φορά

CY: 25/11/2013

EL: 20-08-2013

ΆΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Συσκευασίες:

Δοχεία των 250ml και 1L και σακίδια των 1L, 2.5L και 5L. Στην αγορά μπορεί να μην διατίθενται όλες οι συσκευασίες

ManA 2000

Να χορηγείται μόνον με κτηνιατρική συνταγή

ΚΥΠΡΟΣ:

Διανέμεται από:

Σπύρος Σταυρινίδης Κέμικαλς Λτδ
Λεωφ. Στασίνου 28, 1060 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ: 22 447464 / Φαξ: 22 756902
e-mail: chemicals@stavrinides.com.cy

ΕΛΛΑΔΑ:

Τοπικός αντιπρόσωπος:

ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε.
Φλέμγκ 15
Μαρούσι 151 23
Τηλ. 210 6800900

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

