

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ILFACILLIN P.S. Ενέσιμο εναιώρημα procaine penicillin 200 mg, dihydrostreptomycin (as dihydrostraptomycin Sulphate) 250mg για βοοειδή, αμνούς, χοίρους, σκύλους, γάτες.

2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

Κάθε 1 ml περιέχει:

Δραστικές Ουσίες :

Procaine Penicillin 200 mg
Dihydrostreptomycin (as Dihydrostreptomycin Sulphate) 250 mg

3. ΟΝΟΜΑ & ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΧ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ- ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΤΙΔΩΝ
NORBROOK LABORATORIES LTD

Station Works, Newry, BT 35 6JP
NORTHERN IRELAND

ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε Φλεμινγκ 15 Μαρούσι 15123

4. ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ

Βοοειδή, αμνοί, χοίροι, σκύλοι, γάτες

5. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Θεραπεία των λοιμώξεων που προκαλούνται από μικροοργανισμούς ευαίσθητους στην πενικιλίνη και στη στρεπτομυκίνη σε βοοειδή, αμνούς, χοίρους, σκύλους και γάτες.

6. ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ

Βοοειδή : 1ml/25kg Σ.Β ενδομυϊκά
Αμνοί : 1ml/25kg Σ.Β ενδομυϊκά
Χοίροι : 1ml/25kg Σ.Β ενδομυϊκά
Σκύλοι : 1ml/10kg Σ.Β ενδομυϊκά ή υποδόρια
Γάτες : 1ml/10kg Σ.Β ενδομυϊκά ή υποδόρια

7. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ (ΟΙ)ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Ενδομυϊκά ή υποδόρια

Επαναληπτική χορήγηση μπορεί να γίνει μέχρι 3 φορές με μεσοδιάστημα 24 ωρών. Η επαναληπτική χορήγηση να μη διενεργείται στο ίδιο σημείο του σώματος.

8. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

Καμία.

9. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Να μην χορηγείται σε ζώα με γνωστό ιστορικό ευαισθησίας στις πενικιλίνες, κεφαλοσπορίνες ή στις αμινογλυκοσίδες. Να μη χορηγείται σε περιπτώσεις που είναι γνωστό ότι στο ζώο υπάρχει η παρουσία μικροοργανισμών, οι οποίοι παράγουν β-λακταμάση. Να μην χορηγείται ενδοφλέβια διότι είναι δυνατόν να προκληθεί ισχυρό αναφυλακτικό σοκ ή θρομβοφλεβίτιδα.

10. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Γενικά στους χοίρους, η χορήγηση σκευασμάτων που περιέχουν προκαϊνούχο βενζυλοπενικιλίνη, είναι πιθανό να προκαλέσει παροδικό πτυετό, ελαφριά αδιαθεσία, εμετό και ρίγος. Είναι δυνατό να παρατηρηθούν περιστασιακές αλλεργικές εκδηλώσεις, οι οποίες οφείλονται στην πενικιλίνη και αντιμετωπίζονται με τη χρήση αντιϊσταμινικών σκευασμάτων και επινεφρίνης. Είναι δυνατό να παρατηρηθεί ωτοτοξικότητα και νεφροτοξικότητα που οφείλεται στη στρεπτομυκίνη.

(Παρακαλείστε για οποιαδήποτε άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια να ενημερώνετε τον κτηνίατρό σας)

11. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Κρέας Χοίροι : 20 μέρες
Βοοειδή : 23 μέρες
Αμνοί : 31 μέρες

Γάλα Αγελάδες : 48 ώρες.

Να μη χορηγείται σε πρόβατα που παράγουν γάλα για ανθρώπινη κατανάλωση.

12. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Φυλάσσεται σε θερμοκρασία κάτω των 25 οC. Μην καταψύχετε το εναιώρημα.

Διάρκεια ζωής: 24 μήνες σε θερμοκρασία 2-8°C (ψυγείο) ή 9 μήνες σε θερμοκρασία < 25°C. Μετά το πρώτο άνοιγμα 28 ημέρες σε θερμοκρασία < 25°C.

13. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Ατομα υπερευαίσθητα στις πενικιλίνες ή στην στρεπτομυκίνη να μην έρχονται σε δερματική επαφή, ούτε να χειρίζονται παρόμοια σκευάσματα. Σε περίπτωση ατυχήματος να πλένεστε με άφθονο νερό.

Το προϊόν, καθώς και κάθε άλλο που περιέχει πενικιλίνη ή στρεπτομυκίνη, δεν πρέπει να συνδυάζεται με άλλα αντιβακτηριακά σκευάσματα που έχουν βακτηριοστατική δράση π.χ. σουλφοναμίδες, τετρακυκλίνες. Στις περιπτώσεις αυτές μπορεί να παρατηρηθεί ανταγωνισμός. Είναι δυνατό να αναπτυχθεί διασταυρωμένη μικροβιοαντοχή με άλλα αντιβιοτικά του β-λακταμικού δακτυλίου ή των αμινογλυκοσιδών.

Το προϊόν μπορεί να χορηγηθεί σε ζώα που βρίσκονται σε εγκυμοσύνη ή γαλουχία. Δεν παρατηρούνται τοξικές επιδράσεις στα έμβρυα αλλά ούτε και επηρεάζεται ο αριθμός των εμβρύων. Δεν παρατηρούνται ανεπιθύμητες ενέργειες στα θηλάζοντα νεαρά ζώα.

14. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Οι μη χρησιμοποιημένοι περιέκτες καθώς και τα υπολείμματά τους πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία.

15. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΩΚΛΕΙΣΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ : 29-6-2005 Λήφθησαν υπόψη και μεταγενέστερες τροποποιητικές αποφάσεις

Συσκευασία

Φιαλίδια των 50 ml και 100 ml σε κυτία των 12 φιαλιδίων και φιαλίδιο των 250ml

Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες

Αριθμός άδειας κυκλοφορίας ΕΟΦ. 40232/29-6-2005

Αποκλειστικά για κτηνιατρική χρήση.

Το προϊόν διατίθεται μόνο με κτηνιατρική συνταγή.

Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.

Τηλ.κέντρου δηλητηριάσεων : 210 7793777

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν αυτό, παρακαλείστε να απευθυνθείτε στην :

ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ ΑΕ Φλέμιγκ 15, Μαρούσι 15123, τηλ. 210 6800900

