

Sebacil®




EC 50%

Phoxim

δερματικό διάλυμα

250 ml



Πρόβατα, σκύλος

ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΕΥΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙΔΙΩΝ, ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ
 Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας:
BAYER ANIMAL HEALTH GmbH
 51368 Leverkusen, Germany
 Παρασκευαστής υπεύθυνος για την απευθείας των παρτίδων:
KVP PHARMA AND VETERINÄR PRODUKTE GmbH, Kiel, Germany
 Τοπικός Αντιπρόσωπος:
ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε.
 Φλέγκυ 15
 151 23 Μαρούσι, Αθήνα
 Τηλ.: +30 210 680300-9
 Fax: +30 210 6833488
 E-mail: info@hellafarm.gr

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΗ(ΕΣ) ΟΥΣΙΑ(ΕΣ) ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ:
 Το 100 ml διαλύματος περιέχουν:
 Δραστικό συστατικό: Phoxim 50 g
 Έκδοχα: N-Butanol, Methylisobutylketone, P-Methylphenylethyl(2,7)-phenoxy-polyglycol (27)-ether, P-Methylphenylethyl(2,7)-phenoxy-polyglycol (17)-ether, Calcium salt of n-Dodecylbenzenesulfonic acid, Xylitol

ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)

Ενδείκνυται για την καταπολέμηση της οαροκτιπής φώρας, των φθειρών, των μυγών, των κρούτων και των άλλων εξωτερικών των προβάτων και των σκύλων. Μετά από τα καλύτερα σφάλματα, κρούτων και άλλων που είναι ευαίσθητα στο **SEBACIL** δερματικό διάλυμα είναι τα εξής: *Sarcoptes*, *Psoroptes*, *Chorioptes*, *Psoroptes ovis*, *Melophagus ovinus*, *Dermanis ovis*, *Lucilia cuprina*, *Rhipicephalus evertsi*, *Hyalomma spp.*, *Amblyomma*, *Bovicapillus spp.*, *Stomoxys calcitrans* και *Musca autumnalis*.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Απαγορεύεται η χρήση του μαζί με ζωοτροφές ή το πόσιμο νερό (τότε είναι δηλητηρία). Να μη χορηγείται σε ασθενή, πολύ καταπονημένα ή σε υπό ανάμνηση ζώα. Προσοχή στη χορήγηση του προϊόντος σε ζώα με καρδιακή ανεπάρκεια, βρογχόσπασμο, επιληπτικές κρίσεις και παθήσεις του ήπατος ή των νεφρών. Να μη χορηγείται σε γαλακτοπαραγάγα ζώα τα οποία παράγουν γάλα για ανθρώπινη κατανάλωση.



4 007221 048978

Bayer

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Δεν έχουν αναφερθεί. Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στην παρούσα ετικέτα, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικούς τον κτηνίατρό σας.

ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ

Πρόβατα, σκύλος

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Το **SEBACIL** δερματικό διάλυμα χρησιμοποιείται είτε υπό μορφή λουτρών ή υπό μορφή ψεκασιμών. Προορίζεται αποκλειστικά για εξωτερική χρήση. Τότε είναι ακίνδυνο και γίνεται καλά ανεκτό από τα ζώα. Αφού ανοιχτεί προσεκτικά το φιαλίδιο, αραιώνεται με νερό σε αναλογία:

Ψεκασιμός: 1 ml **SEBACIL** δερματικό διάλυμα σε 1 λίτρο νερού
Αντιπαρασιτικά λουτρά: 1 ml **SEBACIL** δερματικό διάλυμα σε 2 λίτρα νερού

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Δεν έχουν αναφερθεί. Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στην παρούσα ετικέτα, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικούς τον κτηνίατρό σας.

ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ

Πρόβατα, σκύλος

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Το **SEBACIL** δερματικό διάλυμα χρησιμοποιείται είτε υπό μορφή λουτρών ή υπό μορφή ψεκασιμών. Προορίζεται αποκλειστικά για εξωτερική χρήση. Τότε είναι ακίνδυνο και γίνεται καλά ανεκτό από τα ζώα. Αφού ανοιχτεί προσεκτικά το φιαλίδιο, αραιώνεται με νερό σε αναλογία:

Ψεκασιμός: 1 ml **SEBACIL** δερματικό διάλυμα σε 1 λίτρο νερού
Αντιπαρασιτικά λουτρά: 1 ml **SEBACIL** δερματικό διάλυμα σε 2 λίτρα νερού

μυϊκούς σπασμούς, αναπνευστική δυσχέρεια και απώλεια συνείδησης. Σε περίπτωση που παρατηρηθούν τα παραπάνω στο ζώο ή στο άτομο που χορηγεί το προϊόν, θα πρέπει να ζητηθεί η συμβουλή κτηνίατρο ή ιατρού. Οι περιπτώσεις δηλητηρίασεων (λήψη με την τροφή από προσοξεία ή αμέλεια κλπ.) αντιμετωπίζονται με τη χορήγηση θειικής ατροπίνης 1% ως εξής: Πρόβατα-Σκύλος: 2-5 ml. Σε σοβαρές περιπτώσεις επαναλάβετε την ένεση έπειτα από 30 λεπτά.

Ασυμβατότητες: Δεν είναι γνωστή καμία.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Απορρίψτε τις κενές φιάλες ή τα υλικά συσκευασίας με πλήρη ασφάλεια σύμφωνα με τις εθνικές απαιτήσεις. Προσοχή επιβλαβών, εύφλεκτο. Μη μολύνετε τα ποτάμια, τους ταμειωτές νερού, τις υδάτινες οδούς, τα φράγματα και άλλες πηγές

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

Βλ. παράγραφο ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ)

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Κρέας & εδώδιμο ιστό: Πρόβατα: 46 ημέρες. Να μην χορηγείται σε ζώα που παράγουν γάλα για ανθρώπινη κατανάλωση.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Να φυλάσσεται σε θερμοκρασία μικρότερη των 25°C, προστατευμένο από την έκθεση στον ήλιο. Διάρκεια ζωής μετά το πρώτο άνοιγμα του περιέκτη: 6 μήνες. Διάρκεια ζωής μετά την ανασύσταση (αραιωμένο προϊόν): 24 ώρες (σε θερμοκρασία περιβάλλοντος)

ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ)

Ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες χρήσης. Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά. Να φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα και ζωοτροφές. Μην πίνετε, τρώτε ή καννίζετε κατά τη χρήση του προϊόντος. Σε περίπτωση που κατά λάθος υπάρξει κατάποση ή επαφή με τους οφθαλμούς, να αναζητήσετε αμέσως ιατρική βοήθεια και να επιδείξετε στον ιατρό το εσώκλειστο φύλλο οδηγιών

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

Βλ. παράγραφο ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ)

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Κρέας & εδώδιμο ιστό: Πρόβατα: 46 ημέρες. Να μην χορηγείται σε ζώα που παράγουν γάλα για ανθρώπινη κατανάλωση.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Να φυλάσσεται σε θερμοκρασία μικρότερη των 25°C, προστατευμένο από την έκθεση στον ήλιο. Διάρκεια ζωής μετά το πρώτο άνοιγμα του περιέκτη: 6 μήνες. Διάρκεια ζωής μετά την ανασύσταση (αραιωμένο προϊόν): 24 ώρες (σε θερμοκρασία περιβάλλοντος)

ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ)

Ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες χρήσης. Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά. Να φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα και ζωοτροφές. Μην πίνετε, τρώτε ή καννίζετε κατά τη χρήση του προϊόντος. Σε περίπτωση που κατά λάθος υπάρξει κατάποση ή επαφή με τους οφθαλμούς, να αναζητήσετε αμέσως ιατρική βοήθεια και να επιδείξετε στον ιατρό το εσώκλειστο φύλλο οδηγιών

νερού. Το προϊόν είναι ιδιαίτερα τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, τα πουλιά και τις μέλισσες. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: 04-12-2018

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
 Φιάλες των 30 ml, 100 ml, 250 ml, 1 L και 5 L. Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες. Αριθμός Άδειας Κυκλοφορίας: 5592/31-01-2011/K-0025301

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείσθε να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας.

Χορηγείται με συνταγή κτηνίατρο ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777

(01)04007221048978

Sebacil®




EC 50%

Phoxim

δερματικό διάλυμα

250 ml



Πρόβατα, σκύλος

Αρ. Παρτίδας:
Ημ. Λήξης:

ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΕΥΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙΔΙΩΝ, ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ
 Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας:
BAYER ANIMAL HEALTH GmbH
 51368 Leverkusen, Germany
 Παρασκευαστής υπεύθυνος για την απευθείας των παρτίδων:
KVP PHARMA AND VETERINÄR PRODUKTE GmbH, Kiel, Germany
 Τοπικός Αντιπρόσωπος:
ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε.
 Φλέγκυ 15
 151 23 Μαρούσι, Αθήνα
 Τηλ.: +30 210 680300-9
 Fax: +30 210 6833488
 E-mail: info@hellafarm.gr

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΗ(ΕΣ) ΟΥΣΙΑ(ΕΣ) ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ:
 Το 100 ml διαλύματος περιέχουν:
 Δραστικό συστατικό: Phoxim 50 g
 Έκδοχα: N-Butanol, Methylisobutylketone, P-Methylphenylethyl(2,7)-phenoxy-polyglycol (27)-ether, P-Methylphenylethyl(2,7)-phenoxy-polyglycol (17)-ether, Calcium salt of n-Dodecylbenzenesulfonic acid, Xylitol

ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)

Ενδείκνυται για την καταπολέμηση της οαροκτιπής φώρας, των φθειρών, των μυγών, των κρούτων και των άλλων εξωτερικών των προβάτων και των σκύλων. Μετά από τα καλύτερα σφάλματα, κρούτων και άλλων που είναι ευαίσθητα στο **SEBACIL** δερματικό διάλυμα είναι τα εξής: *Sarcoptes*, *Psoroptes*, *Chorioptes*, *Psoroptes ovis*, *Melophagus ovinus*, *Dermanis ovis*, *Lucilia cuprina*, *Rhipicephalus evertsi*, *Hyalomma spp.*, *Amblyomma*, *Bovicapillus spp.*, *Stomoxys calcitrans* και *Musca autumnalis*.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Απαγορεύεται η χρήση του μαζί με ζωοτροφές ή το πόσιμο νερό (τότε είναι δηλητηρία). Να μη χορηγείται σε ασθενή, πολύ καταπονημένο ή σε υπό ανάμνηση ζώα. Προσοχή στη χορήγηση του προϊόντος σε ζώα με καρδιακή ανεπάρκεια, βρογχόσπασμο, επιληπτικές κρίσεις και παθήσεις του ήπατος ή των νεφρών. Να μη χορηγείται σε γαλακτοπαραγάγα ζώα τα οποία παράγουν γάλα για ανθρώπινη κατανάλωση.



4 007221 048978

Bayer